

Chapitre 2:

Les lésions élémentaires



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

2.1 Les macules



Macule érythémateuse

Les macules sont des taches non infiltrées, qui se différencient de la peau avoisinante par leur coloration.

La coloration de la peau varie du rose pâle au rouge foncé et s'efface à la vitropression. Elle est secondaire à une vasodilatation plus ou moins intense. (ex.: érythème pudique)

[recherche](#)[contenu](#)[imprimer](#)[dernière page vue](#)[précédente](#)[suivante](#)



Macule vasculaire

Ces taches permanentes, qui s'effacent partiellement ou complètement à la vitropression, sont dues à la présence d'un lacis abondant de vaisseaux dilatés dans le derme superficiel.
(ex.: télangiectasie)



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Macule purpurique

Les macules de couleur rouge ne s'effacent pas à la vitropression. Elles résultent d'épanchements sanguins dans le derme. (ex.: purpura de bateman)
Leur teinte vire à l'ocre avec le temps.



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Macules pigmentaires

Macules pigmentées

Les macules pigmentées de taille variée et de couleur allant de l'ocre au brun foncé, correspondent à des hyperpigmentations mélaniques de l'épiderme (ex.: éphélides). ►

[recherche](#)[contenu](#)[imprimer](#)[dernière page vue](#)[précédente](#)[suivante](#)



Macules pigmentaires

continuation

Les macules ardoisées

Les macules ardoisées sont secondaires à des dépôts de mélanine, s'étendant plus ou moins profondément dans le derme. (ex.: notalgie paresthésique) ►



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Macules pigmentaires

continuation

Les macules achromiques

Les macules achromiques sont des taches blanches, de forme et de taille variées, consécutives à la diminution de la teneur en mélanine de l'épiderme. (ex.: vitiligo)



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

2.2 Les papules



Les papules sont des élevures plus ou moins bien délimitées, de taille variée. Elles sont de 3 types :

Les papules épidermiques

correspondent à un épaissement global de l'épiderme.
(ex.: verrues planes). ►



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Les papules dermiques

correspondent à un épaissement du derme, de nature oedémateuse, inflammatoire ou proliférative.
(ex.: papule ortiée de l'urticaire)



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Les papules dermo-épidermiques

correspondent à un épaississement mixte de l'épiderme et du derme.
(ex.: lichen plan)



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

2.3 Les nodules



Les nodules sont des élevures hémisphériques secondaires à des infiltrations inflammatoires et oedémateuses du derme profond et de l'hypoderme (ex.: nodule rhumatismal).



2.4 Les tubercules



Les tubercules sont des formations solides, saillantes, circonscrites, enchâssées superficiellement dans le derme. Ils s'ulcèrent parfois en cours d'évolution (ex.: lupus tuberculeux).



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

2.5 Les végétations



Les végétations sont des excroissances d'allure filiforme ou lobulée, de consistance généralement molle (ex.: condylome acuminé).



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

2.6 Les verrucosités



Les verrucosités sont des végétations recouvertes d'un enduit corné plus ou moins épais. (ex.: verrue vulgaire)



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

2.7 Les kératoses



Les kératoses consistent en des lésions épidermiques, caractérisées par une accumulation localisée de kératine (ex.: corne cutanée).



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

2.8 Les vésicules



Les vésicules sont des saillies cutanées de petite taille, centrées par une cavité contenant un liquide clair. Elles sont souvent hémisphériques et peuvent être déprimées en leur centre. (ex.: varicelle)



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

2.9 Les bulles



Les bulles sont des élevures plus volumineuses, centrées par une cavité contenant un liquide clair, louche ou hémorragique. Elles diffèrent entre elles par leur dimension, leur tension: bulles flasques ou tendues. (ex.: bulle d'une brûlure thermique)



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue




précédente



suivante

2.10 Les pustules



Les pustules sont des saillies de taille variée, centrées par une cavité renfermant un liquide purulent. Elles surviennent de novo ou correspondent à l'évolution de vésicules ou de bulles. (ex.: pustulose palmo-plantaire)



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

2.11 Les squames



Les squames sont des agrégats de cellules cornées plus ou moins secs formés par les couches superficielles de l'épiderme. Elles se détachent par fragments de taille variée (ex.: ichtyose).



2.12 Les croûtes



Les croûtes sont des concrétions de consistance plus ou moins dure, secondaires au dessèchement de lésions suintantes, hémorragiques ou purulentes (ex.: impétigo).



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

2.13 Les excoriations (ou exulcérations)



Les excoriations sont des plaies très superficielles. Le derme est mis à nu. (ex.: excoriations par grattage)



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

2.14 Les fissures



Les fissures sont des exulcérations linéaires, bordées ou non d'hyperkératose, entamant le derme superficiel (ex.: pied d'athlète).

[recherche](#)[contenu](#)[imprimer](#)[dernière page vue](#)[précédente](#)[suivante](#)

2.15 Les ulcérations



Les ulcérations sont des pertes de substance plus importantes, entamant le derme en profondeur. (ex.: escarre)



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

2.16 La gangrène



La gangrène est une nécrose tissulaire, liée à une oblitération artérielle ou artériolaire (ex.: gelure).



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue




précédente



suivante

2.17 L'atrophie



L'atrophie consiste en un amincissement de la peau, une diminution de sa consistance et de son élasticité (ex.: atrophie sénile).

[recherche](#)[contenu](#)[imprimer](#)[dernière page vue](#)[précédente](#)[suivante](#)

2.18 La cicatrice



La cicatrice correspond à des modifications du derme et de l'épiderme, signes d'un processus fibreux d'intensité variable. Elle est le témoin de la réparation d'une plaie, d'une perte de substance.
(ex.: cicatrice après brûlure)



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

2.19 La sclérose



La sclérose correspond à une induration du tégument, qui perd sa souplesse normale. Elle est liée à une condensation fibreuse dermique (ex: morphee).



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante