

Chapitre 3:

Eczémas

[recherche](#)[contenu](#)[imprimer](#)[dernière page vue](#)[précédente](#)[suivante](#)[lésions élémentaires](#)[causes](#)[image](#)[alphabétique](#)

3.1 Eczémas de contact allergiques et dermatites d'irritation



Eczéma de contact aigu suintant

Eczéma de contact allergique aigu, suintant, des faces de flexion des avant-bras et des bras après applications répétées d'une lotion antiseptique. Réaction allergique à l'hexamidine.

Sur un fond d'érythème congestif, d'innombrables petites vésicules translucides se sont rompues, laissant sourdre une sérosité claire.

lésions élémentaires: Macule érythémateuse; Vésicules

causes: Agents chimiques



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Eczéma de contact chronique d'origine professionnelle

Lésions érythématosquameuses, discrètement kératosiques, crevassées et infectées du dos des doigts chez un maçon. Réaction allergique aux sels de chrome présents dans les ciments.

lésions élémentaires: Macule érythémateuse; Kératoses; Squames; Fissures

causes: Agents chimiques



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Eczéma de contact vésiculeux

Eczéma de contact allergique aigu, érythémato-papulo-vésiculeux du dos des mains chez un kinésithérapeute.

Réaction allergique à la lanoline présente dans une crème de massage. La main droite est plus atteinte que la gauche. L'érythème diffus, mal limité, émietté en bordure, se couvre de petites vésicules translucides. ▶

lésions élémentaires: Macule érythémateuse; Vésicules

causes: Agents chimiques



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Eczéma de contact vésiculeux

continuation

lésions élémentaires: Macule érythémateuse; Vésicules

causes: Agents chimiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Eczéma de contact bulleux

Eczéma de contact allergique aigu du dos de l'avant-pied et des orteils. Réaction allergique aux sels de chrome, agent tannant du cuir des chaussures. Des bulles se sont formées sur fond érythémato-vésiculeux. ►

lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Vésicules;
Bulles

causes:

Agents chimiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Eczéma de contact bulleux

continuation

lésions élémentaires: Macule érythémateuse; Vésicules; Bulles

causes: Agents chimiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Eczéma croûteux

Eczéma de contact allergique au nickel d'un bouton de jeans. A l'endroit du contact, existe un placard croûteux, grisâtre, et partiellement érodé par des excoriations de grattage. En bordure, s'étend un eczéma érythémato-papulo-vésiculeux aux limites floues. ►

lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Papules dermo-épidermiques; Vésicules; Croûtes; Excoriations (ou exulcérations)
causes: Agents chimiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Eczéma croûteux

continuation

lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Papules dermo-épidermiques; Vésicules; Croûtes; Excoriations (ou exulcérations)
Agents chimiques

causes:



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Eczéma de contact sec, érythématosquameux

Eczéma de contact allergique des paupières consécutif à l'utilisation d'une crème antirides.

Réaction allergique au Kathon CG®, agent conservateur de la crème.

Placards eczémateux érythémateux, finement squameux, mal délimités, prurigineux.

lésions élémentaires: Macule érythémateuse; Squames

causes: Agents chimiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Dermatite d'irritation aiguë

Dermatite d'irritation aiguë du dos de la main et des doigts consécutive à un contact avec des détergents. Erythème diffus, prurigineux.

Les limites de l'érythème sont nettes, correspondant à la zone de contact avec les agents irritants.

lésions élémentaires: Macule érythémateuse

causes: Agents chimiques



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Dermatite d'irritation chronique

Dermatite d'irritation chronique du dos de la main et des doigts consécutive à un contact avec des détergents. Erythème squameux, kératosique et craquelé entraînant prurit et sensations douloureuses.

lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Kératoses;
Squames; Fissures

causes:

Agents chimiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Dermatite d'irritation chronique palmaire

Epais placards kératosiques grisâtres ou noirâtres, craquelés par la présence de fissures et entaillés de crevasses. L'image clinique résulte de la conjonction d'agressions physiques (frictions, microtraumatismes) et chimiques.

lésions élémentaires: Kératoses; Fissures

causes: Facteurs mécaniques; Agents chimiques



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

3.2 Eczéma constitutionnel ou dermatite atopique



Dermatite atopique du visage chez le nourrisson

Placards eczémateux de couleur rouge vif, oedémateux, vésiculosuintants.

Les limites sont mal définies. Les lésions prédominent sur les zones convexes du visage: front, joues, menton.

lésions élémentaires: Macule érythémateuse; Vésicules

causes: Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Dermatite atopique : eczéma rétro-auriculaire infecté

Lésions érythémateuses prurigineuses du sillon rétro-auriculaire, centrées sur une crevasse au fond du pli. Des croûtes jaunâtres sont le signe d'une infection microbienne. Ces lésions, classiques dans l'enfance, peuvent subsister à l'âge adulte.

lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Croûtes;
Fissures

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Dermatite atopique de l'enfance

Lésions très prurigineuses d'eczéma suintant des paupières et perlèche atopique.

lésions élémentaires: Macule érythémateuse; Fissures

causes: Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Dermatite atopique des plis chez l'enfant

Placards lichénifiés, très prurigineux des creux poplités, parsemés de stries de grattage. Dans le cas présent, des lésions similaires existent aux autres plis (plis des coudes, rétro-auriculaires, sous-fessiers...). Les lésions peuvent subsister à l'âge adulte.

lésions élémentaires: Excoriations (ou exulcérations)

causes: Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Eczéma des mamelons

Signe de dermatite atopique à l'âge adulte

Lésions eczémateuses aiguës, suintantes du mamelon, de l'aréole et de la région péri-aréolaire. Les limites des lésions sont émiettées ; le prurit est intense et l'évolution, chronique. C'est un signe classique de l'atopie à l'âge adulte.

lésions élémentaires: Macule érythémateuse; Papules dermo-épidermiques; Vésicules

causes: Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Cheilite atopique

La cheilite atopique envahit les lèvres supérieure et inférieure et déborde sur la région péri-buccale. Lésions eczémateuses, sèches entraînant une desquamation chronique.

lésions élémentaires: Squames; Fissures

causes: Non spécifiques



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Dermatite atopique de l'adulte : xérose, lichénifications et prurigo

Polymorphisme lésionnel très particulier : peau d'apparence sèche et rugueuse (xérose), placards lichénifiés. S'y ajoutent des papules de taille variée, très infiltrées, de consistance dure et souvent excoriées. Ce sont les papules de prurigo (qu'on appelait autrefois "prurigo de Besnier").

lésions élémentaires:

Papules dermo-épidermiques;
Excoriations (ou exulcérations)

causes:

Facteurs mécaniques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Conjonctivite atopique

Conjonctivite atopique associée à une blépharite. Cette inflammation des conjonctives est gênante, parfois douloureuse, et souvent d'une désespérante chronicité. Elle n'est pas inhabituelle chez l'atopique adulte.

lésions élémentaires: Macule érythémateuse

causes: Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Dermatite atopique des mains chez l'adulte

Eczéma chronique érythémateux du dos des mains. Un élément assez caractéristique est l'irrégularité de la distribution des lésions ("patchy pattern"). Certains doigts sont atteints, alors que d'autres ne le sont pas. Le dos des mains est irrégulièrement atteint. Ce caractère "illogique" de la topographie des lésions se rencontre fréquemment dans l'atopie.

lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames;
Fissures

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Dartre sèche furfuracée

Tache arrondie d'eczéma sec, érythématosquameux, siégeant sur la joue d'un enfant. Evolution spontanée vers la guérison, avec tendance à l'achromie transitoire résiduelle, d'où le nom de pityriasis alba.

Elle survient plus fréquemment dans le contexte d'une atopie.

lésions élémentaires:

Macule érythémateuse;
Macules achromiques;
Squames

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Dermatose plantaire juvénile

Cette affection, qui siège en général au tiers antérieur de la plante, toujours bilatérale et souvent symétrique, est caractérisée par la triade : érythème, hyperkératose, fissures. La peau prend souvent un aspect brillant, collodionné. Elle se caractérise souvent par des aggravations hivernales et serait peut-être plus fréquente chez les atopiques ("atopic winter feet").



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames;
Fissures

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

Dermatose plantaire juvénile

continuation



lésions élémentaires: Macule érythémateuse; Squames;
Fissures

causes: Non spécifiques



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

3.3 Eczéma nummulaire (eczéma discoïde)



Variété suintante

Plaque érythémateuse ronde (nummus = pièce de monnaie) persillée de nombreuses vésicules suintantes évoluant vers de petites croûtes. ►

lésions élémentaires: Macule érythémateuse; Vésicules; Croûtes

causes: Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Eczéma nummulaire (eczéma discoïde)

continuation

*Variété sèche de l'eczéma
nummulaire*

Plusieurs plaques érythémateuses rondes ou ovalaires, bien délimitées et isolées les unes des autres, dont le diamètre varie de un à plusieurs centimètres. Elles sont recouvertes de fines squames sèches

lésions élémentaires: Macule érythémateuse; Squames

causes: Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

3.4 Eczéma de stase



Placards d'eczéma sec, érythémateux, prurigineux et s'accompagnant souvent de stries de grattage. Ils se localisent parfois le long des trajets variqueux.

lésions élémentaires: Macule érythémateuse; Squames

causes: Non spécifiques



recherche contenu imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

3.5 Eczéma séborrhéique (dermatite séborrhéique)



Eczéma séborrhéique du thorax

Plaques rouges médiothoraciques circonscrites, recouvertes de squames grasses, discrètement prurigineuses. La lésion subit en son centre une évolution très discrètement achromiante.

lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Macules achromiques; Squames

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Eczéma séborrhéique de la lisière du cuir chevelu

Il se caractérise sur le scalp par un érythème diffus, prurigineux, recouvert de squames grasses. Les lésions débordent parfois, comme dans le cas présent, sur le front où elles forment ce qu'on appelle communément la corona seborrheica : taches érythémateuses, parsemées de squames stéatoïdes qui, tout en suivant la lisière du cuir chevelu, dessinent, en bordure, des festons et des arcatures.

lésions élémentaires: Macule érythémateuse; Squames

causes: Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Eczéma séborrhéique du visage

Les lésions, érythémateuses, bien limitées, ont des localisations caractéristiques : lisière du cuir chevelu, plis nasogéniens, pli vertical médiofrontal, bord libre des paupières inférieures.

lésions élémentaires: Macule érythémateuse; Squames

causes: Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

3.6 Dysidrose et eczéma dysidrosique



Dysidrose des doigts

Les vésicules de dysidrose sont regroupées sur les faces latérales des doigts, dures au toucher, enchâssées dans l'épiderme, translucides, comparées classiquement à des "grains de sagou ou de tapioca cuit". Elles s'accompagnent d'un prurit intense.

lésions élémentaires: Vésicules

causes: Non spécifiques



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Dysidrose bulleuse palmaire

Les vésicules enchâssées dans l'épiderme palmaire coalescent pour former de véritables bulles, parfois hémorragiques.

lésions élémentaires: Vésicules; Bulles

causes: Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Eczéma dysidrosique palmaire

L'eczéma dysidrosique représente une association de vésicules de dysidrose et de placards érythémateusquameux aux limites floues. Le prurit est lancinant et l'évolution se fait par poussées successives, voire subintrantes.

lésions élémentaires: Macule érythémateuse; Vésicules; Squames

causes: Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

3.7 Eczéma craquelé (ou érythème craquelé)



Eczéma sec aux limites imprécises évoquant un "dallage irrégulier de pierres plates". Les joints du dallage correspondent à des craquelures plus ou moins profondes, très discrètement saignotantes. On préfère aujourd'hui l'appellation d'érythème craquelé.

lésions élémentaires: Macule érythémateuse; Fissures

causes: Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante