

Chapitre 6:

Infections bactériennes



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

6.1 Impétigo



Impétigo bulleux

Bulles à contenu trouble souvent entourées par un halo érythémateux. Ces bulles se rompent facilement et sont rapidement remplacées par des placards croûteux extensifs. L'impétigo bulleux est classiquement provoqué par le staphylocoque doré.

lésions élémentaires: Bulles; Croûtes

causes: Infection



recherche contenu imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Impétigo croûteux d'emblée

Placards érythémateux recouverts par une croûte jaunâtre. Les lésions péri-orificielles sont les plus fréquentes. L'atteinte périnasale est très caractéristique et impose un traitement prolongé. Le streptocoque bêta hémolytique est l'agent le plus souvent retrouvé dans ce type d'impétigo.

lésions élémentaires: Macule érythémateuse; Croûtes

causes: Infection



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue




précédente



suivante

6.2 Ecthyma



Ulcération torpide, évoluant vers la profondeur et surmontée par une croûte épaisse. L'ecthyma se situe la plupart du temps aux membres inférieurs. Après guérison, il subsiste une cicatrice indélébile. Le streptocoque est souvent l'agent responsable. L'ecthyma est très fréquent dans les pays tropicaux.

lésions élémentaires: Croûtes; Ulcérations

causes: Infection



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

6.3 Folliculite



Papule inflammatoire centrée par une pustule folliculaire. L'agent responsable est la plupart du temps un staphylocoque. Les folliculites sont fréquemment multiples et siègent classiquement sur les fesses, les cuisses ou le visage.

lésions élémentaires: Macule érythémateuse;
Papules dermiques; Pustules

causes: Infection



recherche contenu imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

6.4 Furoncle



Folliculite aiguë profonde débutant par une papule érythémateuse douloureuse, avec apparition d'une pustule centrale. Après évacuation (spontanée ou provoquée) de la composante purulente, le furoncle laisse souvent place à une cicatrice indélébile. Le staphylocoque doré est l'agent responsable.

lésions élémentaires: Papules dermiques; Pustules

causes: Infection



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

6.5 Anthrax



Par définition, l'anthrax résulte de la coalescence de plusieurs furoncles juxtaposés. Un gros macaron douloureux est parsemé de pustulettes qui affleurent à la surface du tégument.

lésions élémentaires: Nodules; Pustules

causes: Infection



recherche contenu imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

6.6 Erysipèle



Placards érythémato-oedémateux, chauds, douloureux, accompagnés de fièvre élevée et d'une atteinte de l'état général. Le streptocoque en est classiquement l'agent responsable. Il peut atteindre le visage et dans ce cas, la limite avec la peau saine est extrêmement nette et surélevée : signe de la marche d'escalier. ►

lésions élémentaires: Macule érythémateuse

causes: Infection



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Erysipèle

continuation

A la jambe, on constate l'existence de vastes placards extensifs, identiques à ceux du visage mais dont la composante périphérique est moins accentuée. Ici encore, l'état général est altéré et la fièvre constante. La plupart du temps, une infection mixte (bactéries gram positif et/ou bactéries gram négatif) peut être mise en évidence. Il existe souvent une porte d'entrée comme par exemple une crevasse interdigitoplantaire ou une plaie consécutive à un traumatisme.

lésions élémentaires: Macule érythémateuse

causes: Infection



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue




précédente



suivante

6.7 Cellulite rétro-orbitaire



(Dermo-hypodermite bactérienne profonde)

Infection profonde rétro-orbitaire se manifestant à la peau par un oedème péri-orbitaire avec atteinte de l'état général et fièvre élevée. Il s'agit d'une pathologie d'une évidence sévère étant donné la possible extension vers le sinus caverneux.

lésions élémentaires: Nodules; Croûtes

causes: Infection



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue




précédente



suivante

6.8 Emboles septiques



Petites lésions érythématopustuleuses survenant simultanément en divers endroits du tégument. Le contexte général oriente vers le point de départ de ces emboles septiques (atteinte cardiaque dans le cadre d'un rhumatisme articulaire aigu, gonococcie en voie de généralisation.)

lésions élémentaires: Macule érythémateuse; Pustules

causes: Infection



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

6.9 Borreliose



Érythème migrant ou maladie de Lyme

Vaste placard érythémateux d'évolution centrifuge avec pseudoguérison centrale. Parfois, une petite lésion cicatricielle est retrouvée au milieu (trace d'une morsure de tique). ▶

lésions élémentaires: Macule érythémateuse

causes: Infection



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Érythème migrant ou maladie de lyme

continuation

L'érythème migrant est provoqué par une infection à *Borrelia*. Le terme de "maladie de LYME", n'est pas acceptable pour désigner les borrelioses "européennes".

lésions élémentaires: Macule érythémateuse

causes: Infection



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Pseudolymphome a type de borreliose

Dans certains cas, la borreliose se reconnaît cliniquement par l'existence d'un ou de plusieurs nodules empâtés siégeant essentiellement aux parties découvertes. Les lobules de l'oreille sont la localisation la plus classique. Ce type de "Pseudolymphome" entre également dans le cadre des borrelioses. On peut assimiler cette lésion à l'ancien "lymphocytome cutané bénin".

lésions élémentaires: Nodules

causes: Infection



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

6.10 Infection par proteus



Rarement, lors de plaies contuses, non soignées, un germe gram négatif comme le proteus ou le pseudomonas peut provoquer une nécrose de l'extrémité distale d'un doigt.

lésions élémentaires: Gangrène

causes: Infection



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

6.11 Maladie des griffures de chat (cat scratch disease)



Nodules plus ou moins fluctuants avec ulcération et croûte centrale accompagnées de volumineuses adénopathies. Le jeune patient a été griffé par son chat quelques semaines auparavant. ►

lésions élémentaires: Nodules; Croûtes

causes: Infection; Facteurs mécaniques



recherche contenu imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Maladie des griffures de chat (cat scratch disease)

continuation

lésions élémentaires: Nodules; Croûtes; Ulcérations

causes: Facteurs mécaniques



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

6.12 Intertrigo



Placards érythémateux vernissés ("en feuillets de livre" centrés sur le fond d'un grand pli). La macération et l'infection par germes banaux est classique.

lésions élémentaires: Macule érythémateuse

causes: Infection



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

6.13 Tuberculose cutanée



Lupus tuberculeux

Grande lésion jaune rougeâtre atteignant la face et le lobule de l'oreille. Aspect de pseudo guérison centrale. La vitropression permet de mettre en évidence une coloration rouge orangé tout à fait caractéristique, que les dermatologistes du début de ce siècle comparaient à du "sucre d'orge", friandise tombée aujourd'hui en désuétude. ►

lésions élémentaires: Tubercules; Cicatrice

causes: Infection



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Lupus tuberculeux

continuation

lésions élémentaires: Tubercules

causes: Infection



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Ecouvilles

Adénopathie cervicale tuberculeuse chronique avec ulcération cutanée.

lésions élémentaires: Ulcérations; Cicatrice

causes: Infection



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Bécégite

Abcédation non spécifique faisant suite à un vaccin par le BCG. La bécégite fait en général suite à une injection trop profonde.

lésions élémentaires: Nodules

causes: Agents chimiques



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

6.14 Mycobactérioses atypiques



Mycobactériose par *mycobacterium marinum*

Cette pathologie se retrouve essentiellement chez les aquariophiles (maladie des aquariums) et se présente classiquement sous la forme de nodules plus ou moins nombreux étagés "en chapelet" s'étendant le long d'un trajet lymphatique. Il s'agit de papulonodules plus ou moins kératosiques et/ou ulcérés. En général, il n'existe que peu de douleurs. La biopsie profonde avec mise en culture sur milieu adéquat permet très facilement de mettre la mycobactérie en évidence. Les papulonodules peuvent être uniques. ▶

lésions élémentaires: Nodules; Ulcérations

causes: Infection



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue

précédente

suivante



Mycobactériose par *mycobacterium marinum*

continuation

Les papulonodules peuvent être multiples. Dans ce dernier cas, on parle parfois de forme sporotrichoïde de la mycobactériose.

lésions élémentaires: Nodules; Ulcérations

causes: Infection



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Mycobactériose par *mycobacterium chelonae*

Abcès et nodules violacés survenant quelques semaines après injections multiples en mésothérapie (dans le cadre du traitement d'une "cellulite").

lésions élémentaires: Nodules; Ulcérations

causes: Facteurs mécaniques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

6.15 Corynébactérioses



Erythrasma

Vaste macule brunâtre ou jaune chamois, nettement délimitée, aux bords arrondis, la plupart du temps symétrique, touchant soit les aines, soit les aisselles. Ces lésions sont homogènes et finement squameuses. Le germe responsable est le corynebacterium minutissimum. L'examen en lumière de Wood permet de visualiser une fluorescence rougeâtre saumonée.

lésions élémentaires: Macules pigmentées; Squames

causes: Infection



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Trichomycose axillaire

Il s'agit d'une infection bactérienne due à des corynébactéries.

Les poils axillaires sont entourés de petits nodules jaunâtres correspondant à des amas de bactéries. Il n'existe que peu de symptômes subjectifs. La sueur prend parfois une coloration jaunâtre.

lésions élémentaires: Non spécifiques

causes: Infection



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Kératolyse ponctuée

Petites érosions ponctuées et serpigneuses de la couche cornée se retrouvant essentiellement aux régions d'appui des plantes entraînant une interruption des empreintes plantaires. Souvent, il existe une hyperhidrose plantaire associée.

Les érosions correspondent à des desquamations en bloc de la couche cornée envahie de corynébactéries.

lésions élémentaires: Excoriations (ou exulcérations)

causes: Infection



recherche contenu imprimer



dernière page vue



précédente



suivante