

Chapitre 7:

Tréponématoses et autres maladies sexuellement transmissibles



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

7.1 Syphilis



Chancre syphilitique

Exulcération avec érosion siégeant sur le gland ou le fourreau. Induration nette au palper. Adénopathie inguinale volumineuse le plus souvent unilatérale. ▶

lésions élémentaires: Excoriations (ou exulcérations)

causes: Infection



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Chancre syphilitique *continuation*

Chez la femme, le chancre est souvent accompagné d'un oedème important des grandes lèvres. Les caractéristiques du chancre féminin sont identiques à celui de l'homme.

lésions élémentaires: Excoriations (ou exulcérations)

causes: Infection



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Syphilis secondaire (roséole syphilitique)

Survenant environ six semaines après le début du chancre, la syphilis secondaire se présente sous forme de macules rosées, ovalaires, peu ou non squameuses et non prurigineuses. Ces macules siègent essentiellement sur le tronc.

lésions élémentaires: Macule érythémateuse

causes: Infection



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Syphilis secondaire tardive

Papules rouge sombre, parfois brunâtres, non prurigineuses, très nettement indurées, situées au tronc ainsi que sur les régions proximales des membres.

lésions élémentaires: Papules dermiques

causes: Infection



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Syphilides papuleuses

Macules discrètement rougeâtres avec collerette desquamative périphérique (collerette de Biett). Ces syphilides papuleuses surviennent de quatre à douze mois après le chancre.

lésions élémentaires:

Macule érythémateuse;
Papules dermiques; Squames

causes:

Infection



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

7.2 Gonococcie génitale



Rougeur diffuse du gland, gouttelette purulente au niveau du méat, dysurie importante, pollakiurie. Il faut noter la présence simultanée de deux molluscums contagiosums également transmis sexuellement.

lésions élémentaires:

Macule érythémateuse;
Papules épidermiques

causes:

Infection



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante