

Chapitre 9:

Parasitoses - Arthropodes



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

9.1 Gale humaine ou scabiose



Maladie parasitaire due au sarcoptes scabiei. Sillons noirâtres, de 5 à 15 mm de long, terminés en une extrémité par un renflement ("éminence acarienne"). Les faces latérales des doigts ainsi que les faces antérieures du poignet en sont les endroits de prédilection. Nombreuses traces d'excoriations parfois accompagnées de fines vésicules plus ou moins translucides disséminées sur l'ensemble du tégument. ▶

lésions élémentaires: Non spécifiques

causes: Infection



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Gale humaine ou scabiose

continuation

Ces excoriations sont essentiellement le signe d'un prurit vespéral et nocturne très important. ▶

lésions élémentaires: Excoriations (ou exulcérations)

causes: Infection



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Gale humaine ou scabiose

continuation

Nodules scabieux : lésions nodulaires rougeâtres très nettement infiltrées, extrêmement prurigineuses des aisselles, du scrotum et de la verge, subsistant même après un traitement bien conduit. ▶

lésions élémentaires: Nodules

causes: Infection



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Gale humaine ou scabiose

continuation

Chez l'enfant, les lésions atteignent le plus souvent les pieds : nombreuses papules excoriées extrêmement prurigineuses.

lésions élémentaires: Papules épidermiques; Pustules

causes: Infection



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

9.2 Gale animale



Nombreuses petites papules prurigineuses disséminées sur l'ensemble du tégument. L'évolution en est spontanément régressive. Il n'existe pas de sillon. L'atteinte de l'animal de compagnie est classiquement retrouvée (chat ou chien).

lésions élémentaires: Papules dermiques

causes: Infection



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

9.3 Pédiculose



Vaste placard impétiginisé de la région de la nuque lié au grattage à mettre en relation avec une pédiculose très importante non diagnostiquée. ▶

lésions élémentaires: Croûtes

causes: Infection



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Pédiculose

continuation

Zone d'attache d'une lente sur un cheveu.

lésions élémentaires: Non spécifiques

causes: Infection



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

9.4 Morpions



Excoriations et présence de lentes fermement accrochées sur les poils pubiens. Il existe également des morpions (phthirius pubis) s'accrochant sur des poils pubiens. Sur le corps, on constate parfois l'existence de macules bleu grisâtre relativement discrètes (maculae cerulae). ▶

lésions élémentaires: Non spécifiques

causes: Infection



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Morsures

continuation

Ces macules ardoisées correspondent à la libération de toxines par le morpion à l'occasion des piqûres successives.

lésions élémentaires: Macules ardoisées

causes: Infection



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

9.5 Piqûres d'insectes



Trombiculose

Réactions immunologiques à des piqûres d'aoûtats (larves hématophages de trombiculae). Petites lésions prurigineuses parfois en ligne siégeant en un endroit quelconque du tégument avec une prédilection pour les zones de striction. On retrouve parfois une acumination centrale.



lésions élémentaires: Papules dermiques

causes: Infection



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Trombiculose

continuation

lésions élémentaires: Papules dermiques

causes: Infection



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Prurigo strophulus

Survenant essentiellement chez l'enfant, le prurigo strophulus se présente sous forme de nombreuses petites papules érythémateuses parfois finement vésiculeuses. Essentiellement présentes sur les jambes, ces lésions sont extrêmement prurigineuses et sont volontiers excoriées. Parfois, on constate une disposition linéaire, ce qui rend le diagnostic beaucoup plus évident. En général, le prurigo strophulus est provoqué par un ectoparasite, hôte d'un chat ou d'un chien.

lésions élémentaires: Papules dermiques; Vésicules

causes: Infection



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Piqûres de puces

Importantes papules inflammatoires à disposition linéaire. Il existe une nette acumination centrale. La contamination se fait classiquement aux dépens d'un animal de compagnie (chat ou chien) qui en est porteur. ▶

lésions élémentaires: Papules dermiques

causes: Infection



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Piqûres de puces

continuation

Dans certains cas, les lésions deviennent franchement bulleuses, voire hémorragiques.

lésions élémentaires: Bulles

causes: Infection



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

9.6 Leishmaniose



Volumineuse lésion papulocroûteuse entourée d'un "bourelet inflammatoire". Il n'existe ni douleur ni adénopathie associée. ▶

lésions élémentaires: Papules dermiques; Vésicules

causes: Infection



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Leishmaniose

continuation

L'évolution est chronique et cette lésion résiste aux traitements antiseptiques classiques. ▶

lésions élémentaires: Papules dermiques; Vésicules

causes: Infection



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Leishmaniose

continuation

Après quelques mois, la lésion s'affaïsse et laisse subsister une cicatrice plus ou moins visible. Un protozoaire du genre leishmania est responsable. Le phlébotome en est l'agent vecteur, ce qui explique que, dans la majorité des cas, les lésions de leishmaniose se retrouvent sur les zones découvertes (visage en particulier).

lésions élémentaires: Cicatrice

causes: Infection



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

9.7 Larva migrans (Iarbish)



Trajet serpigineux inflammatoire terminé par une petite papule extrêmement prurigineuse. La larva migrans est provoquée par une larve d'ankylostome qui va migrer d'environ 1 centimètre par jour provoquant de la sorte un allongement du trajet inflammatoire. ▶

lésions élémentaires: Papules dermiques

causes: Infection



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Larva migrans (Iarbish)

continuation

L'homme se contamine la plupart du temps au bord de la plage (sol pollué par des déjections animales).

Les larvæ migrantes cutanées se retrouvent essentiellement aux pieds ou aux fesses.

lésions élémentaires: Papules dermiques

causes: Infection



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

9.8 Tungose ou puce chique



Nodule prurigineux, inflammatoire, centré par un petit pertuis noirâtre situé dans la région péri-unguéale d'un orteil. Il peut exister une surinfection secondaire (abcédation). La tungose est provoquée par une puce hématoophage : la *Tunga penetrans*.



lésions élémentaires: Nodules

causes: Infection



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Tungose ou puce chique

continuation

La contamination se fait classiquement aux pieds (marche à pieds nus dans les zones d'endémie, surtout Afrique et Amérique Centrale).

lésions élémentaires: Nodules

causes: Infection



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante