

Capitolo 14:

Tumori cutanei premaligni



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo

lesioni basali

cause

foto

alfabetico



Cheratosi attinica (cheratosi senile)

Chiazze rosse rilevate e ben circoscritte con una superficie ruvida ricoperta da squame di spessore variabile. Le lesioni sono isolate o multiple e si sviluppano soprattutto sulle zone scoperte come la superficie dorsale delle mani od il viso. ▶

lesioni basali: Cheratosi; Squame

cause: Raggi solari, raggi ultravioletti



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



Cheratosi attinica (cheratosi senile)

continua

In questa illustrazione si possono osservare alcune caratteristiche dell'invecchiamento della cute dovuto alla luce solare: cute giallastra, rughe marcate. Se non curati, alcuni casi di cheratosi attinica si trasformano in carcinomi squamocellulari.

lesioni basali: Cheratosi; Squame

cause: Raggi solari, raggi ultravioletti



ricerca



contenuti



stampa




ultimo schermo visto



indietro



prossimo



Cheilite attinica

Chiazza abbastanza ben circoscritta, eritemato-squamosa, a volte ricoperta di croste e che colpisce pressoché unicamente il labbro inferiore. Sotto uno strato ipercheratosico, l'epitelio è atrofico e sanguina facilmente al minimo trauma. La cheilite attinica si propaga lentamente e può degenerare in un vero carcinoma squamocellulare.

lesioni basali: Macula eritematosa; Squame;
Croste

cause: Raggi solari, raggi ultravioletti



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



Leucoplasia - cheratosi tabagica (stomatitis nicotina)

Chiazze bianche o grigiastre sul labbro inferiore o la mucosa buccale, più o meno arrotondate e ben delimitate. Colpiscono più sovente l'uomo e la nicotina favorisce probabilmente la loro formazione.

Evolvono naturalmente in un carcinoma squamocellulare.

lesioni basali: Macule acromiche; Verruche

cause: Agenti chimici



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



Malattia di Bowen

Lesione un po' rilevata, discoide, rotonda od ovale, con orli netti, di dimensioni variabili, di colore rosso o bruno-rossastro e ricoperta di una squamo-crosta o di crosticine. Secondo le conoscenze attuali, si tratta di un carcinoma intraepidermico (in situ). ▶

lesioni basali: Macula eritematosa; Squame;
Croste

cause: Nessuna specificità



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



Malattia di Bowen

continua

lesioni basali: Macula eritematosa; Squame;
Croste

cause: Nessuna specificità



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



Eritroplasia di Queyrat

Malattia di Bowen delle mucose. Chiazza rossa situata sul glande, ben circoscritta, un po' protuberante e dalla superficie lucida. Si riscontrano lesioni simili sulle mucose vulvari.

lesioni basali: Macula eritematosa

cause: Nessuna specificità



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



Papulosi Bowenoidi

Papule eritematose o brunastre sul glande e l'asta del pene, sulla vulva e talvolta sulla regione perianale. La loro istopatologia è affine a quella della malattia di Bowen. I papillomavirus umani (16, 18, 33) sono la causa iniziale di questa papulosi.

lesioni basali: Papule epidermiche

cause: Nessuna specificità



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



Radiodermite

Un'atrofia cicatriziale, delle telangiectasie e delle anomalie nella pigmentazione costituiscono il quadro clinico classico della radiodermite.

In uno stadio ulteriore, possono comparire delle ulcerazioni.

Un carcinoma basocellulare o squamocellulare può svilupparsi dopo parecchi anni.

lesioni basali: Ulcere; Atrofia; Cicatrici

cause: Raggi X



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



Xeroderma pigmentoso

Si tratta di una malattia ereditaria a trasmissione autosomica recessiva, dovuta ad un difetto dei sistemi enzimatici per la riparazione del DNA dopo un'irradiazione con raggi ultravioletti. È caratterizzata da un'estrema fotosensibilità e da lesioni attiniche croniche tra cui l'atrofia cutanea, le lentiggini e la cheratosi solare. Alcuni tumori possono svilupparsi abbastanza in fretta: cheratoacantoma, carcinoma basocellulare o squamocellulare, melanoma maligno.

lesioni basali: Macule pigmentate; Noduli; Cheratosi; Atrofia

cause: Raggi solari, raggi ultravioletti



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



Melanosi di Dubreuilh

(Melanoma su lentigo maligna, melanoma sviluppatosi su precancerosi di Dubreuilh)

Macula pigmentata policroma, non rilevata e non ben delimitata. Il suo colore varia dal bigio pallido al nero. La melanosi di Dubreuilh si osserva nei soggetti anziani, per lo più al volto, più raramente al dorso delle mani ed alle gambe. Dissemina molto lentamente fino a raggiungere un diametro di diversi centimetri in una decina d'anni.

lesioni basali: Macule pigmentate

cause: Raggi solari, raggi ultravioletti



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo