

Capitolo 15:

# Tumori cutanei maligni



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo

lesioni basali

cause

foto

alfabetico

# 15.1 Carcinomi basocellulari



## Epitelioma nodulare

Tumore globulare, di colorito cereo o rossastro, più o meno traslucido (carcinoma "perlaceo"), la cui superficie liscia è percorsa da sottili telangiectasie. Si localizza soprattutto al viso, ma può anche colpire il dorso, gli arti e la regione genitale. L'evoluzione è lenta e l'ulcerazione rara.

lesioni basali: Noduli

cause: Raggi solari, raggi ultravioletti



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



## Ulcus rodens

Questa variante del carcinoma basocellulare è caratterizzata da

1. un'ulcera come lesione iniziale
2. una notevole disseminazione in superficie
3. una notevole disseminazione in profondità: il tumore "mangia" nel tessuto (perciò il nome di ulcus rodens)
4. la persistenza di un margine traslucido, perlaceo e un po' telangiectasico è molto caratteristica dei carcinomi basocellulari.

lesioni basali: Noduli; Ulcere

cause: Raggi solari, raggi ultravioletti



ricerca

contenuti

stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



## Epitelioma piano cicatriziale

Questa variante ha più l'aspetto di una chiazza che di un nodulo. Tutta l'area centrale della lesione è bianca, atrofica, sclerosa e simile alla morfea, ma a differenza di quest'ultima è percorsa da telangiectasie. All'orlo della lesione c'è spesso un rigonfiamento perlaceo, telangiectasico ed indurato, talvolta ricoperto da crosticine.

lesioni basali: Noduli; Atrofia; Sclerosi

cause: Raggi solari, raggi ultravioletti



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



## Epitelioma pigmentato

Variante rarissima, caratterizzata da un notevole eccesso di melanina. È di solito nodulare e non ulcerato.

lesioni basali: Noduli

cause: Raggi solari, raggi ultravioletti



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



## Epitelioma pagetoide (carcinoma basocellulare superficiale)

Si presenta di solito come una chiazza rosa, ben circoscritta da contorni arrotondati. È spesso delimitato da un orletto filiforme e perlaceo, che lo differenzia dalla malattia di Bowen. La sua crescita è molto lenta. Questa variante predilige il tronco.

lesioni basali: Macula eritematosa; Squame

cause: Nessuna specificità



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo

## 15.2 Carcinomi squamocellulari



La maggior parte dei carcinomi squamocellulari colpisce le zone scoperte: il volto (in particolare il labbro inferiore) e il dorso delle mani. Si sviluppano su cute apparentemente indenne o, nella più parte dei casi, sopra una lesione precancerosa: cheratosi solare, malattia di Bowen. Tendono a metastatizzare, principalmente per via linfatica.

lesioni basali: Noduli

cause: Raggi solari, raggi ultravioletti



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



## Carcinoma squamocellulare del viso

Grande lesione ulcerata che sanguina e forma croste. Il rigonfiamento periferico è molto indurato. La base dell'intera lesione è nettamente infiltrata.

lesioni basali: Noduli

cause: Raggi solari, raggi ultravioletti



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



## Carcinoma squamocellulare del labbro inferiore

Questa ulcerazione saniosa è circondata da un rigonfiamento periferico indurato. Nel caso presente si è sviluppata da una cheilite attinica.

lesioni basali: Noduli; Squame; Croste; Ulcere

cause: Raggi solari, raggi ultravioletti

cause:



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



## Carcinoma squamocellulare del pene

Tumore vegetante e fortemente ulcerato del glande.

lesioni basali: Noduli

cause: Nessuna specificità



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo

# 15.3 Malattia di Paget



Chiazza eritemato-squamosa, incrostata ed erosa in alcuni punti, situata sul capezzolo e l'aureola. Il suo bordo perfettamente definito la differenzia dalla reazione eczematosa (vedere pagina 52). Pure da rilevare è la scomparsa del rilievo del capezzolo. Si riscontra questo carcinoma nel 3 - 5% dei casi di cancro del seno. Esso si sviluppa principalmente dopo la menopausa. I siti extramammari sono rari e limitati alle zone cutanee dotate di ghiandole sudoripare apocrine (organi genitali, perineo e regione perianale).

lesioni basali: Macula eritematosa; Squame; Croste

cause: Nessuna specificità



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo

# 15.4 Metastasi cutanee



Le metastasi cutanee di tumori profondi possono esibire vari aspetti clinici:

### *Linfagite carcinomatosa*

La si può osservare nei casi classici di cancro del seno ed è caratterizzata da un'estesa chiazza infiammatoria, a volte erroneamente chiamata "erisipela carcinomatosa". ▶

lesioni basali: Macula eritematosa; Noduli

cause: Nessuna specificità



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



## Metastasi cutanee

*continua*

*Metastasi nodulari cutaneo-subcutanee*

Formano masse sferiche, acromiche o bluastre ed incassate nella cute.

lesioni basali: Noduli

cause: Nessuna specificità



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo

# 15.5 Melanoma (maligno)



Il melanoma è un tumore che si sviluppa sia de novo dai melanociti epidermici sia dalle cellule dei nevi congeniti giunzionali e misti, sia molto più raramente dai nevi intradermici e dal nevo blu. Produce metastasi per via linfatica od ematica. Si conoscono diverse varianti di melanoma:

lesioni basali: Macule pigmentate; Noduli

cause: Nessuna specificità



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



## Melanoma ad estensione superficiale

Chiazza melanica, lievemente rialzata, di colore variabile dal bruno al nero ed a margini policiclici. Dopo una fase di crescita orizzontale che dura diversi mesi, incomincia la fase d'invasione verticale, durante la quale penetra nel tessuto profondo. Può colpire qualsiasi parte del corpo, ma predilige il dorso nell'uomo e le gambe nella donna.

lesioni basali: Macule pigmentate

cause: Nessuna specificità



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



## Melanoma nodulare

Nodulo infiltrato, di colore bruno o nero, a volte rosso-violaceo e più raramente acromico. La lesione, spesso cupoliforme, inseguito si ulcera e sanguina.

lesioni basali: Noduli

cause: Nessuna specificità



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



## Melanoma sviluppatosi su una melanosi precancerosa di Dubreuilh

Formazioni nodulari infiltrate, pigmentate o meno, a volte sanguinanti, sviluppatosi su una melanosi di Dubreuilh.

lesioni basali: Macule pigmentate; Noduli

cause: Raggi solari, raggi ultravioletti



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



## Melanoma acro-lentiginoso (melanoma delle estremità)

Localizzato sulle estremità (palmo della mano, pianta del piede, estremità delle dita) è affine al melanoma ad estensione superficiale o al melanoma nodulare, dei quali rappresenta meramente una localizzazione particolare.

lesioni basali: Macule pigmentate; Noduli

cause: Nessuna specificità



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



## Metastasi di melanoma

Numerosi noduli indurati, neri o bluastri, che si sviluppano vicino ad un melanoma asportato chirurgicamente in precedenza.

lesioni basali: Macule pigmentate; Noduli

cause: Nessuna specificità



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo

## 15.6 Dermatofibrosarcoma protuberans (fibrosarcoma di Darier-Ferrand)



Grande tumore multinodulare e bozzuto, aderente alla superficie cutanea che però non si ulcera, infiltrante il derma e l'ipoderma, spesso oltre i limiti rilevabili con la palpazione.

Si sviluppa progressivamente senza causare dolori. Colpisce gli adulti di entrambi i sessi con una localizzazione preferenziale sul tronco e la radice degli arti. Questo fibrosarcoma manifesta soprattutto una malignità locale ma può anche, in casi eccezionali, produrre metastasi.

lesioni basali: Noduli

cause: Nessuna specificità



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



## Angiosarcoma di Kaposi

Noduli violacei sulle caviglie ed i piedi di un paziente anziano. Nel presente caso non si è nel contesto di una sindrome di deficienza immunitaria acquisita (AIDS).

lesioni basali: Macula vascolare; Noduli

cause: Nessuna specificità



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo

## 15.7 Linfomi maligni - micosi fungoide



Tra i molti linfomi cutanei maligni, la micosi fungoide (linfoma epidermotropo a cellule T) costituisce un'entità particolare. Nello stadio eruttivo il quadro clinico è caratterizzato da chiazze infiltrate, di colore rosso-rame opaco e disposte ad arco. ▶

lesioni basali: Macula eritematosa; Noduli

cause: Nessuna specificità



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



## Linfomi maligni - micosi fungoide

*continua*

I tumori possono svilupparsi ed ulcerarsi in seguito.

lesioni basali: Ulcere

cause: Nessuna specificità



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo

# 15.8 Sindromi paraneoplastiche



Le neoplasie maligne possono associarsi a malattie cutanee prive di carattere neoplastico e non direttamente legate alla presenza del tumore (contrariamente alle metastasi) ma evolventi con la neoplasia maligna. Esse regrediscono quando la neoplasia maligna viene eliminata e ricompaiono in caso di una sua recidiva. Queste dermatosi, chiamate dermatosi paraneoplastiche, possono insorgere allorché la neoplasia maligna è già nettamente sviluppata, ma possono anche costituire il segno rivelatore di un tumore di piccole dimensioni (segno di Bazex).

lesioni basali: Nessuna specificità

cause: Nessuna specificità



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



## Acrocheratosi paraneoplastica di Bazex

L'acanthosis maligna nigricans, l'erythema gyratum repens di Gammel, la cheratosi paraneoplastica di Bazex e l'ipertricosi lanuginosa acquisita sono alcuni esempi di malattie paraneoplastiche cutanee. Le ultime due sono state scelte per illustrare le sindromi paraneoplastiche.

lesioni basali: Verruche; Cheratosi

cause: Nessuna specificità



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



## Ipertricosi lanuginosa

Compare improvvisamente (entro poche settimane) e si presenta come una peluria di numerosi peli lunghi, lanuginosi, bianchi, serici e fini che si estendono sull'intera cute glabra e specialmente sul viso. La crescita è rapida e la capigliatura diviene più folta. Le papille della mucosa linguale sono ipertrofiche e vitree. ▶

lesioni basali: Nessuna specificità

cause: Nessuna specificità



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



## Ipertricosi lanuginosa continua

Si osserva un netto cambiamento del senso del gusto. L'apparire di un tale quadro clinico deve far nascere il sospetto di una neoplasia associata. Nel presente caso si è riscontrato una neoplasia al seno. Il trattamento radicale del cancro provoca la scomparsa dell'ipertrofia lanuginosa acquisita. La ricorrenza della neoplasia è accompagnata dalla ricomparsa dell'ipertricosi (dermatosi paraneoplastica in senso stretto).

lesioni basali: Nessuna specificità

cause: Nessuna specificità



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo