

Capítulo 3:

Eczemas



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



siguiente

lesiones básicas

causas

fotografía

alfabético

3.1 Dermites de contacto e dermatites traumáticas



Eczema de contacto agudo exsudativo

Eczema de contacto alérgico agudo, exsudativo, das zonas de flexão dos antebraços e dos braços após aplicações repetidas de uma loção anti-séptica. Reacção alérgica à hexamidina. Sobre um fundo de eritema congestivo, irromperam numerosas pequenas vesículas translúcidas, exsudando uma serosidade clara.

lesões elementares: Mácula eritematosa; Vesículas

causas: Agentes químicos



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



Eczema de contacto crónico de origem profissional

Lesões eritemato-descamativas discretamente ceratósicas, fissuradas e infectadas, nos dorsos dos dedos de um pedreiro. Reacção alérgica aos sais de crómio presentes no cimento.

lesões elementares: **Mácula eritematosa; Ceratoses; Escamas; Fissuras**

causas: **Agentes químicos**



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior seguinte



Eczema de contacto vesiculoso

Eczema de contacto alérgico agudo, eritemato-pápulo-vesiculoso dos dorsos das mãos de um cinesiterapeuta. Reacção alérgica à lanolina presente num creme de massagem. A mão direita está mais afectada que a esquerda. O eritema difuso, com um limite pouco claro e fragmentado, cobre-se de pequenas vesículas translúcidas. ▶

lesões elementares: Mácula eritematosa; Vesículas

causas: Agentes químicos



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



Eczema de contacto vesiculoso

continuação

lesões elementares: **Mácula eritematosa; Vesículas**

causas: **Agentes químicos**



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



Eczema de contacto bolhoso

Eczema de contacto alérgico agudo da superfície dorsal do ante-pé e dos dedos dos pés. Reacção alérgica aos sais de crómio, utilizado para curtir o couro do calçado. Formação de bolhas sobre fundo eritemato-vesiculoso. ▶

lesões elementares: Mácula eritematosa; Vesículas; Bolhas

causas: Agentes químicos



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



Eczema de contacto bolhoso

continuação

lesões elementares: **Mácula eritematosa; Vesículas; Bolhas**

causas: **Agentes químicos**



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



Eczema com crosta

Eczema de contacto alérgico ao níquel de um botão de calças de ganga. Na zona de contacto, existe uma placa crostosa, acinzentada, com uma erosão parcial provocada pelas escoriações de coceira. Nos bordos, um eczema eritemato-pápulo-vesiculoso estende-se com limites pouco nítidos. ▶

lesões elementares:

Mácula eritematosa; Pápulas dermo-epidérmicas; Vesículas; Crostas; Escoriações

causas:

Agentes químicos



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



Eczema com crosta

continuação

lesões elementares:

Mácula eritematosa; Pápulas dermo-epidérmicas; Vesículas; Crostas; Escoriações

causas:

Agentes químicos



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



Eczema de contacto eritemato-descamativo

Eczema de contacto alérgico das pálpebras, provocado pela utilização de um creme anti-rugas. Reacção alérgica ao Kathon CG®, agente conservante do creme. Placas eczematosas eritematosas, finamente descamativas, mal delimitadas, pruriginosas.

lesões elementares: Mácula eritematosa; Escamas

causas: Agentes químicos



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



Dermite traumática aguda

Dermite traumática aguda dos dorsos da mão e dos dedos, provocada pelo contacto com detergentes. Eritema difuso, pruriginoso. Os limites do eritema são nítidos, correspondendo à zona de contacto com os agentes irritantes.

lesões elementares: Mácula eritematosa

causas: Agentes químicos



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



Dermite traumática crónica

Dermite traumática crónica dos dorsos da mão e dos dedos provocada pelo contacto com detergentes. Eritema descamativo, ceratósico e asteatótico, provocando prurido e sensação dolorosa.

lesões elementares: Mácula eritematosa; Ceratoses; Escamas; Fissuras

causas: Agentes químicos



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



Dermite traumática crónica palmar

Placas espessas, ceratósicas, acinzentadas ou enegrecidas, apresentando fissuras. A imagem clínica resulta da combinação de agressões físicas (fricções, microtraumatismos) e químicas.

lesões elementares: Ceratoses; Fissuras

causas: Factores mecânicos; Agentes químicos



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte

3.2 Eczema constitucional ou atópico



Eczema atópico da face no recém-nascido

Placas eczematosas de cor vermelho vivo, edematosas, apresentando vesículas exsudativas. Os limites estão mal definidos. As lesões predominam nas zonas convexas da face: fronte, regiões malares, mento.

lesões elementares: Mácula eritematosa; Vesículas

causas: Sem especificação



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior seguinte



Eczema atópico retroauricular infectado

Lesões eritematosas exsudativas e pruriginosas do sulco retroauricular, centradas numa fissura na base da prega. Crostas amareladas assinalam uma infecção microbiana. Estas lesões, clássicas na infância, podem persistir na idade adulta.

lesões elementares: **Mácula eritematosa; Crostas; Fissuras**

causas: **Sem especificação**



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



Eczema atópico da criança

Lesões muito pruriginosas de eczema exsudativo das pálpebras e queilite angular atópica.

lesões elementares: Mácula eritematosa; Fissuras

causas: Sem especificação



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



Eczema atópico das pregas na criança

Placas liquenificadas, muito pruriginosas dos espaços popliteus, com escoriações de coceira. No presente caso, existem lesões similares nas outras pregas (sangradouros, regiões retro-auriculares, interglúteas...). As lesões podem subsistir na idade adulta.

lesões elementares: Escoriações

causas: Sem especificação



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



Eczema dos mamilos

Sinal de eczema atópico na idade adulta

Lesões eczematosas agudas, exsudativas do mamilo, da aréola e da região peri-areolar. Os limites das lesões são indefinidos; o prurido é intenso e a evolução crónica. É um sinal clássico de atopia na idade adulta.

lesões elementares: Mácula eritematosa; Pápulas dermo-epidérmicas; Vesículas

causas: Sem especificação



procura



índice



imprimir




última página vista



anterior



seguinte



Queilite atópica

A queilite atópica atinge os lábios superior e inferior e, por vezes, a região peribucal.

Lesões eczematosas, secas, provocando descamação crónica.

lesões elementares: Escamas; Fissuras

causas: Sem especificação



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior seguinte



Eczema atópico do adulto: xerose, liquenificação e prurigo

Polimorfismo lesional muito especial: pele seca e rugosa (xerose), placas liquenificadas. Existem também pápulas de dimensão variada, fortemente infiltradas, de consistência rija e frequentemente escoriadas. Trata-se de pápulas de prurigo (antigamente denominadas "prurigo de Besnier").

lesões elementares: Pápulas dermo-epidérmicas;
Escoriações

causas: Factores mecânicos



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



Conjuntivite atópica

Conjuntivite atópica associada a blefarite. Esta inflamação das conjuntivas é incómoda, por vezes dolorosa, e frequentemente de uma desesperante cronicidade. Aparece com alguma regularidade no adulto atópico.

lesões elementares: Mácula eritematosa

causas: Sem especificação



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior seguinte



Eczema atópico das mãos do adulto

Eczema crónico eritematoso e descamativo dos dorsos das mãos. Um elemento bastante característico é a irregularidade da distribuição das lesões ("patchy pattern"). Alguns dos dedos são atingidos, enquanto que outros não o são. Os dorsos dos dedos são afectadas de uma forma irregular. Este carácter "ilógico" da topografia das lesões encontra-se frequentemente na atopia.

lesões elementares: **Mácula eritematosa; Escamas; Fissuras**

causas: **Sem especificação**



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



Pitiríase alba

Mancha arredondada de eczema seco, eritematoso e descamativo, localizado na região malar da face de uma criança.

Evolução espontânea para a cura, com tendência para a acromia transitória residual, que deu origem à designação de pityriasis alba. Ocorre com mais frequência no contexto de uma atopia.

lesões elementares: Mácula eritematosa;
Máculas acrómicas;
Escamas

causas: Sem especificação



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior seguinte



Dermatose plantar juvenil

Esta afecção, que se localiza geralmente no terço anterior da planta, sempre bilateral e frequentemente simétrica, é caracterizada pela tríade: eritema, hiperqueratose e fissuras. A pele adquire, com frequência, um aspecto brilhante. Caracteriza-se frequentemente por agravamentos no Inverno e será, eventualmente, mais comum nos atópicos. ("atopic winter feet"). ▶

lesões elementares: Mácula eritematosa; Escamas; Fissuras

causas: Sem especificação



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior seguinte



Dermatose plantar juvenil

continuação

lesões elementares: **Mácula eritematosa; Escamas; Fissuras**

causas: **Sem especificação**



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte

3.3 Eczema numular (eczema discóide)



Variedade exsudativa

Placa eritematosa redonda (nummulus = moeda) coberta de numerosas vesículas exsudativas, evoluindo para pequenas crostas.



lesões elementares: Mácula eritematosa; Vesículas; Crostas

causas: Sem especificação



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



Eczema numular (eczema discóide)

continuação

Varietade seca de eczema numular

Várias placas eritematosas, redondas ou ovulares, bem delimitadas e isoladas entre si, cujo diâmetro varia de um a vários centímetros. Estão cobertas por finas escamas secas.

lesões elementares: Mácula eritematosa; Escamas

causas: Sem especificação



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte

3.4 Dermite de estase



Placas de eczema seco, eritematoso, descamativo e pruriginoso, acompanhadas muitas vezes de escoriações de coceira. Situam-se, por vezes, ao longo de trajectos varicosos.

lesões elementares: Mácula eritematosa; Escamas

causas: Sem especificação



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte

3.5 Dermite seborreica



Dermite seborreica do tórax

Placas eritematosas, mediotorácicas circinadas, cobertas de escamas gordas, discretamente pruriginosas. A lesão sofre, no seu centro, uma evolução muito discretamente acromiante.

lesões elementares: Mácula eritematosa; Mácula acrómica; Escamas

causas: Sem especificação



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



Dermite seborreica do limite de implantação capilar

No couro cabeludo, caracteriza-se por eritema difuso, pruriginoso, coberto de escamas gordas.

As lesões atingem, por vezes, como no caso presente, a fronte onde formam o que é normalmente designado por corona seborreica: manchas eritematosas, cobertas de escamas esteatoides que, seguindo o limite de implantação capilar, desenham margens em forma de grinalda e de arcada.

lesões elementares: Mácula eritematosa; Escamas

causas: Sem especificação



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



Dermite seborreica da face

As lesões, eritematosas e descamativas, bem delimitadas, têm localizações características: limite de implantação capilar, sulcos naso-genianos, glabella, bordo livre das pálpebras inferiores.

lesões elementares: Mácula eritematosa; Escamas

causas: Sem especificação



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte

3.6 Desidrose e eczema desidrótico



Desidrose dos dedos

As vesículas de desidrose aparecem agrupadas nas partes laterais dos dedos, sendo duras ao tacto, inseridas na epiderme, translúcidas, classicamente comparadas a "grãos de sagu ou de tapioca cozida". São acompanhadas de prurido intenso.

lesões elementares: Vesículas

causas: Sem especificação



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



Desidrose bolhosa palmar

As vesículas encaixadas na epiderme palmar coalescem para formar verdadeiras bolhas, por vezes, hemorrágicas.

lesões elementares: Vesículas; Bolhas

causas: Sem especificação



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



Eczema desidrótico palmar

O eczema desidrótico representa uma associação de vesículas de desidrose e de placas eritematosas e descamativas, com margens difusas. O prurido é intenso e a evolução processa-se por surtos sucessivos.

lesões elementares: **Mácula eritematosa; Vesículas; Escamas**

causas: **Sem especificação**



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte

3.7 Eczema asteatótico ou "craquelé"



Eczema seco, com limites imprecisos, evocando um "pavimento irregular de pedras planas". As fissuras existentes são mais ou menos profundas, sangrando muito discretamente.

lesões elementares: Mácula eritematosa; Fissuras

causas: Sem especificação



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte