

Capítulo 14:

Dermatosis Pre-cancerosas



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



siguiente

alfabético

fotografía

causas

lesiones básicas



Ceratoses actínicas

Placas em relevo, eritematosas e bem delimitadas, cuja superfície rugosa está coberta de escamas mais ou menos espessas. As lesões são isoladas ou múltiplas; localizam-se sobretudo nas regiões expostas, como os dorsos das mãos, ou a face. ►

lesões elementares: Ceratoses; Escamas

causas: Luz solar, radiação ultravioleta



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguite



Ceratoses actínicas

continuação

É de notar, neste caso, alguns sinais de foto-envelhecimento cutâneo (ou heliodermia: pele flácida, rugas acentuadas,...). Quando não tratadas, um determinado número de ceratoses actínicas podem evoluir para carcinoma espino-celular.

lesões elementares: Ceratoses; Escamas

causas: Luz solar, radiação ultravioleta



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



Queilite actínica

Placa eritemato-descamativa, por vezes, crostosa, relativamente bem delimitada, localizada sobretudo no lábio inferior.

Sob a hiperqueratose, o epitélio é atrófico e sangra facilmente ao mínimo microtraumatismo.

A queilite actínica é lentamente progressiva no tempo e pode degenerar num verdadeiro carcinoma espinoelular.

lesões elementares: Mácula eritematosa; Escamas; Crostas

causas: Luz solar, radiação ultravioleta



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguite



Leucoplasia (nicotínica)

Placas mais ou menos arredondadas, brancas ou acinzentadas, bem delimitadas, no lábio inferior ou na mucosa bucal. Ocorrem com mais frequência no homem, sendo provavelmente originadas pelo tabagismo. Podem evoluir para o carcinoma espinocelular.

lesões elementares: Máculas acrómicas; Verrucosidades

causas: Agentes químicos



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



Doença de Bowen (carcinoma in situ)

Lesão discóide, redonda ou ovalada, com limites nítidos, de dimensões variadas, de cor eritematosa ou eritemato-acastanhada, ligeiramente saliente, coberta por uma escama-crosta ou pequenas crostas. A concepção actual da doença de Bowen é que se trata de um carcinoma intraepidérmico (in situ). ▶

lesões elementares: Mácula eritematosa; Escamas; Crostas

causas: Sem especificação



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguite



Doença de Bowen (carcinoma in situ)

continuação

lesões elementares: Mácula eritematosa; Escamas;
Crosta

causas: Sem especificação



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



Eritroplasia de Queyrat

(carcinoma intraepitelial da glande)

Localização mucosa da doença de Bowen. Placa vermelha, bem delimitada, discretamente saliente, com uma superfície lisa na glande peniana. Ocorrem lesões semelhantes na mucosa da vulva.

lesões elementares: Mácula eritematosa

causas: Sem especificação



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



Papulose bowenoide

Pápulas eritematosas ou acastanhadas, atingindo a glânde, o forro do pênis, a vulva e, por vezes, a região peri-anal. Histopatologicamente, aproxima-se da doença de Bowen. Os vírus HPV (16,18,33) são a causa inicial desta papulose.

lesões elementares: Pápulas epidérmicas

causas: Sem especificação



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



Radiodermite

Atrofia cicatricial, telangiectasias, anomalias da pigmentação constituem a imagem clássica da radiodermite. Num estágio avançado, podem surgir ulcerações. Decorridos vários anos, podem desenvolver-se basiliomas ou carcinomas espinocelulares.

lesões elementares: Ulcerações; Atrofia; Cicatriz

causas: Raios X



procura



índice



imprimir




última página vista



anterior



seguinte



Xeroderma pigmentosum

Doença hereditária, de transmissão autosómica recessiva, o xeroderma pigmentosum tem, como suporte genético, um déficite enzimático dando origem a perturbações de reparação do ADN, após irradiação ultravioleta. A afecção caracteriza-se por extrema fotossensibilidade e por lesões actínicas crónicas, incluindo atrofia cutânea, efélides, ceratoses actínicas. Alguns tumores podem desenvolver-se precocemente: cerato-acantomas, basiliomas ou carcinomas espinocelulares, melanomas malignos.

lesões elementares: Máculas pigmentadas; Nódulos;
Ceratoses; Atrofia

causas: Luz solar, radiação ultravioleta



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguite



Melanose de Dubreuilh

(Lentigo maligno, melanoma de dubreuilh)

Mácula pigmentada, sem relevo, policromática: a sua cor varia do bege claro ao negro. Os contornos são irregulares. A melanose de Dubreuilh manifesta-se nos indivíduos idosos, sobretudo na face, mais raramente nos dorsos das mãos ou nas pernas. Evolui muito lentamente para atingir vários centímetros numa dezena de anos.

lesões elementares: Máculas pigmentadas

causas: Luz solar, radiação ultravioleta



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguite